

So funktioniert es:

- ✓ Buchbar im Frühjahr über unsere Website
- ✓ Unter „Service“ Trichogramma-Ausbringung wählen und auf den Link „Jetzt bestellen“ klicken
- ✓ Kontaktdaten einpflegen
- ✓ Felder einzeichnen oder als shp-Datei aus ibalis hochladen
- ✓ AGB's akzeptieren und buchen

Förderung:

(Stand 2023)

- ✓ In Bayern: KULAP
 - Förderung 50 €/ha
 - auf 100 % der Maisflächen des Betriebs müssen Trichogramma ausgebracht werden
 - mindestens 200.000 Trichogramma/ha
- ✓ In Baden-Württemberg: FAKT
 - Förderung 60 €/ha
 - Fördermaßnahmen für FAKT beachten



WIR EMPFEHLEN:

Zweimalige Befliegung mit
(1x 220.000 + 1x 110.000)
Trichogramma je Hektar

**TRICHOGRAMMA-
AUSBRINGUNG**
DEHNER AGRAR SERVICE



Stammhaus Rain am Lech
Dehner Agrar GmbH & Co. KG
Donauwörther Str. 3-5, 86641 Rain
Tel.: 0 90 90 / 77 58 88
Fax: 0 90 90 / 77 73 95
agrarsupport@dehner.de
dehner-agrar.de

Niederlassung Döbeln
Dehner Agrar GmbH & Co. KG
Am Fuchsloch 13, 04720 Döbeln
Tel.: 0 34 31 / 60 64 33 0
Fax: 0 34 31 / 70 25 22

Quelle & Bildrechte:
BIOCARE Gesellschaft für Biologische
Schutzmittel mbH
Dorfstr. 4, 37574 Einbeck

DER MAISZÜNSLER

- ✓ Der intensive Maisanbau begünstigt die Verbreitung und Entwicklung des bedeutendsten Maisschädlings Deutschlands: dem Maiszünsler.
- ✓ Die Weibchen legen die Eier auf die Blattunterseite der Wirtspflanze ab.
- ✓ Die Junglarven fressen zu Beginn die äußeren Pflanzenteile der Maispflanze, später bohren sich die Schädlinge in den Stängel ein.
- ✓ Im Laufe der Vegetation fressen sich die Larven im Stängelinernen nach unten
- ✓ Folgen:
 - die Maispflanzen brechen im unteren Bereich ab
 - Wasser- und Nährstoffversorgung wird blockiert
 - Bohrlöcher bilden Eintrittsstellen für Pilze wie z.B. Fusarium-Arten

ZWEIMALIGE AUSBRINGUNG MIT ERHÖHTER TRICHOGRAMMA-ANZAHL - EFFEKTIVE MAIZÜNSLERBEKÄMPFUNG -

Unsere klare Empfehlung

Unsere Leistung	Info's zum Produkt
▪ Zweimalige Ausbringung per Drohne von (1x 220.000 + 1x 110.000) Trichogramma je Hektar ▪ 6 verschiedene Schlupfwellen der Trichogramma bei beiden Ausbringungen für aktiven Schutz während des gesamten Zünslerfluges ▪ Trichogramma schlüpfen in einem Zeitraum von bis zu 3 Wochen je Ausbringung ▪ Nach ca. 14 Tagen erfolgt i.d.R. die zweite Ausbringung, damit die Trichogramma kontinuierlich die Eigelege des Maiszünslers parasitieren	▪ Flächen mit mittlerem bis erhöhtem Zünsler-Befallsdruck ▪ bei Weizen als Folgekultur, verringert Fusarieneinträge ▪ bei intensiver Maisfruchtfolge
Anwendungsbereich	Wirkungsgrad
	bis 90 % zur Bekämpfung des Maiszünslers

PRAXISVERSUCHE HABEN BESTÄTIGT:

Bei der **Zweimaligen Befliegung** und mit der Ausbringung von 330.000 Trichogramma wird der höchste Wirkungsgrad zur Bekämpfung des Maiszünslers erzielt.


Quelle: BIO CARE Gesellschaft für Biologische Schutzmittel mbH



Kompetent beraten. Von Anfang an.

Ihre Vorteile:

- ✓ Keine Anwesenheit notwendig, Felddaten einzeichnen – los geht's!
- ✓ Falls Sie gerne bei der Ausbringung dabei sind – kein Problem, wir kontaktieren Sie!
- ✓ Mithilfe des Zünslermonitorings der amtlichen Dienste bringen wir die Trichogramma zum optimalen Zeitpunkt auf Ihren Feldern aus
- ✓ Doppelte Trichogramma-Anzahl bei der ersten Ausbringung, starke Populationsreduktion des Maiszünslers und damit effektive Bekämpfung
- ✓ Nützlingsschonend
- ✓ Förderfähig
- ✓ Für Biobetriebe zugelassen



Quelle: BIO CARE Gesellschaft für Biologische Schutzmittel mbH

Diese Produktvariante ermöglicht Ihnen den optimalen Schutz Ihres Maisbestands in jeder Befallssituation!

DEHNER AGRAR SERVICE



Die *Trichogramma*-Weibchen parasitieren den Großteil der Maiszünsler-Eier, indem sie ihre Eier in die Eier des Maiszünslers ablegen. Daraufhin entwickeln sich in den Maiszünsler-Eiern statt Maiszünslern neue *Trichogramma*-Schlupfwespen, die nach dem Schlupf ihrerseits weitere Maiszünsler-Eier parasitieren.

Die erste Anwendung auf dem Feld erfolgt je nach Region ab Mitte Juni bis Anfang Juli. Die zweite Anwendung erfolgt dann jeweils ca. 14 Tage später.